

PERFIL CLÍNICO E DEMOGRÁFICO DOS CASOS DE TUBERCULOSE DA 9ª GERÊNCIA DE SAÚDE DA PARAÍBA

Ednan Cardoso de Sousa- FSM- ednanelit@hotmail.com

Karoline Dantas de Souza Torquato- FSM- karoline.torquato@hotmail.com

Italo Franklin Barbosa Alencar e Silva- FSM- italofranklin@live.com.pt

Talina Carla da Silva – FSM – talinacarla@hotmail.com

Sheylla Nadjane Batista Lacerda- FSM- SheyllaBatista@bol.com.br

Introdução: A tuberculose é uma doença de rápida transmissão, por apresentar um contágio direto. Entretanto, para que uma pessoa infectada desenvolva a doença diversos fatores relacionados ao hospedeiro influenciam: a idade, estado nutricional, estado imune, co-morbidades, vacinação pelo BCG e ao patógeno como a virulência e o tropismo para alguns órgãos ou tecidos. No ano de 2012, 8,6 milhões de pessoas desenvolveram a tuberculose em todo o mundo, mantendo-a assim, como um grave problema de saúde pública. Neste mesmo ano, no Brasil, 71.230 pessoas desenvolveram a doença, destes 1.433 casos ocorreram no estado da Paraíba. Diante da magnitude epidemiológica da doença, julga-se necessário estudos que busquem entender o perfil destes doentes. **Objetivo:** Traçar o perfil Clínico e demográfico dos doentes com tuberculose cadastrados nos municípios pertencentes à 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, no ano de 2012. **Metodologia:** Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo. Teve como população 32 casos de doentes com tuberculose notificados no SINAN no ano de 2012. Realizado em 15 municípios que compõem a 9ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba, situada na cidade de Cajazeiras-PB. Teve como variáveis do estudo: sexo, faixa etária, raça e forma clínica (Forma pulmonar, extrapulmonar, Pulmonar + extrapulmonar). Para obtenção dos dados utilizou-se o SINAN-NET. Para análise foi realizada técnica estatística descritiva obtendo-se a frequência absoluta e relativa, utilizando o programa SPSS 18. **Resultados:** Foram constatados 32 casos de tuberculose nos municípios pertencentes à 9ª Gerência de Saúde da Paraíba, situada no município de Cajazeiras-PB, no ano de 2012. Obteve-se no perfil demográfico, uma

proporção para o sexo masculino de 65,6%, faixa etária de 20 a 39 anos 53,1% e raça branca de 25%. No perfil Clínico detectou-se que 90% desenvolveram a forma pulmonar, 6,6% extrapulmonar, 3,4% pulmonar + extrapulmonar.

Conclusão: Conclui-se que os grupos mais vulneráveis ao adoecimento foram do sexo masculino, faixa etária produtiva e raça branca. A forma de maior prevalência foi a pulmonar, exercendo forte influência na magnitude e transcendência da tuberculose por ser a forma responsável pela cadeia de transmissão da doença e conseqüentemente da manutenção dos elevados índices da mesma, o que a torna um grave problema de saúde pública. Sugere-se uma maior intensificação nas ações como: busca de sintomático respiratório, educação em saúde, supervisão e acompanhamento da tomada da medicação, visando o diagnóstico de forma precoce e bloqueio na cadeia de transmissão, contribuindo para o combate e controle da doença.

Palavras Chaves: Tuberculose, Saúde Pública, Transmissão de doenças.