

CÂNCER DE ÚTERO: SINTOMAS E TRATAMENTOS

Área de concentração em Saúde Coletiva

Macela Genuíno Alves¹; Gabriela Rozado Nóbrega²; Leoandro Crizanto Leite Lopes³,
Andressa Souza Gomes de Oliveira⁴ Claudia Morgana Soares⁵

¹ Faculdades Integradas de Patos, marcelagenuino@hotmail.com

² Faculdades Integradas de Patos, contatogabriela4@gmail.com

³ Faculdades Integradas de Patos, leoandro.leite@gmail.com

⁴ Faculdades Integradas de Patos, andressasgos2@hotmail.com

⁵ Faculdades Integradas de Patos, claudiamorganavet@gmail.com

INTRODUÇÃO: O Câncer de Colo de Útero é uma lesão invasiva intrauterina ocasionada principalmente pelo HPV, o papilomavírus humano. Manifesta-se através de verrugas na mucosa da vagina, do pênis, do ânus, da laringe e do esôfago. Pode levar de 10 a 20 anos para seu desenvolvimento. Favorecem o aparecimento da doença: Sexo desprotegido, Histórico de DSTs (HPV), Tabagismo, Idade precoce da primeira relação sexual e multiparidade. Os sintomas muitas vezes não começam até que se torne invasivo e acometa tecidos próximos. A prevenção se dá através da detecção precoce da doença. Para detectar o Câncer do colo de útero é necessária a realização do exame Papanicolau que pode ser complementado com Colposcopia com a realização de biópsia para se confirmar o diagnóstico. O presente trabalho objetiva apresentar os sintomas e tratamentos do câncer de útero. **METODOLOGIA:** Foi realizado através de busca literária em bancos de dados científicos do Google acadêmico, scielo com as seguintes palavras indexadoras: tipos de câncer, saúde da mulher, colo do útero foram excluídos trabalhos com dados epidemiológicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** Os sintomas mais comuns são: Sangramento vaginal, sangramento após relação sexual, dor na relação sexual. Mulheres com lesões pré-cancerosas ou em estágio inicial geralmente não apresentam sintomas. Em geral manifesta-se a partir de 30 anos, aumentando seu risco rapidamente até atingir o pico etário entre 50 e 60 anos. O exame Papanicolau é a principal ferramenta para diagnosticar as lesões precursoras do câncer. O tratamento pode ser realizado por cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. A cirurgia consiste na retirada do tumor ocasionalmente na retirada do útero e da porção superior da vagina. A radioterapia visa reduzir o volume tumoral e melhorar o local, para realização da radioterapia e a quimioterapia é indicada em estágios avançados. A prevenção tem o preservativo como aliado. **CONCLUSÃO:** O câncer de colo de útero é uma doença silenciosa que exige cuidados preventivos no intuito de minimizar as complicações decorrentes do seu aparecimento. Os profissionais de saúde, particularmente os enfermeiros assume um papel importantíssimo na prevenção e aconselhamento dos pacientes.

Palavras-Chave: Câncer, Mulher, Papilomavírus, Útero.