



## AVALIAÇÃO DE REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS EM PACIENTES ONCOLÓGICOS.

1Débora Truta Duarte-debora-duarte@hotmail.com

1Marcelino Rodrigues Batista

1Tatiany Fernandes Quirino

2Ivana Maria Fechine

3Lindomar de Farias Belém-fariasbelem@yahoo.com.br

1Aluno Graduação Farmácia -UEPB

2 Professora Doutora Departamento de Farmácia-UEPB

3 Orientadora Doutora Departamento de Farmácia-UEPB

### RESUMO

**INTRODUÇÃO:** A monitorização e segurança de medicamentos são elementos essenciais para o uso efetivo de medicamentos e para a assistência médica de alta qualidade, especialmente, também, em pacientes oncológicos, que devido ao seu estado físico comprometido configura como paciente de risco a predispor Reações Adversas a Medicamentos. Ela tem a capacidade de inspirar segurança e confiança de pacientes e profissionais da saúde em relação aos medicamentos e contribui para o seu uso racional. Farmacovigilância é importante para que se possa usar de modo racional um fármaco, promovendo uma terapêutica mais adequada às necessidades dos pacientes, evitando riscos desnecessários. **OBJETIVO:** Desenvolver serviços do Centro de Farmacovigilância, com a finalidade de realizar notificação de possíveis reações adversas na Clínica Oncológica do Hospital da Fundação Assistencial da



Paraíba com a finalidade de promover o Uso Racional de Medicamentos. Notificar e estudar o perfil de RAM em pacientes de risco a desenvolvê-las e aprimorar a identificação das reações adversas de modo a melhorar o cuidado com o paciente e garantir sua segurança em relação ao uso de medicamentos.

**METODOLOGIA:** Trabalho foi realizado no Centro de Farmacovigilância da Fundação Assistencial da Paraíba (CEFAP) tendo caráter descritivo transversal e foi desenvolvido entre o período de Agosto de 2012 a Julho de 2013, caracterizado pela busca ativa de casos de reações adversas a medicamentos apresentadas por pacientes oncológicos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Para os 27 pacientes acompanhados na oncologia foram prescritos 173 medicamentos, distribuídos entre 19 categorias terapêuticas, os analgésicos e antieméticos aparecem como os mais prescritos. Em relação aos medicamento mais prescrito a dipirona e o omeprazol foram os mais prescritos. Dentre os diagnósticos ativos, o mais prevalente foi Neoplasia de colo uterino e a síndrome neoplásica. Quanto as diferentes possíveis RAM, as com maior frequência foram vômito e prurido. Dentre os medicamentos suspeitos de causarem as RAM o omeprazol foi considerado o principal medicamento responsável por causar RAM. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O Centro de Farmacovigilância da Fundação Assistencial da Paraíba (CEFAP) contribuiu para a redução dos riscos relativos à utilização de medicamentos através do acompanhamento sistemático da ocorrência de reações adversas a medicamentos na população hospitalizada, bem como da informação/educação de profissionais de saúde afim proporcionar o uso adequado de medicamentos.

**PALAVRAS CHAVE:** Farmacovigilância; Uso racional de medicamentos; Oncologia