



A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA HPB - UMA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Flávia Kléuvia de Sousa Barbosa; flaviaflavia21@hotmail.com;

Renata Livia S. F. Medeiros; renaliviamoreira@hotmail.com;

Mikarla Simone Fernandes; mikarla_pdf@hotmail.com;

NaryanneNathally da Silva Lacerda; naryanne.silva@hotmail.com;

Gildilene Abrantes Sarnento; gildileneabrantess@hotmail.com.

INTRODUÇÃO: A hiperplasia prostática benigna ou hiperplasia benigna da próstata (HBP) é uma condição caracterizada pelo aumento do tamanho da próstata, não tendo nenhuma relação com o câncer da próstata. Aos 40 anos 10% dos homens já têm uma próstata aumentada de tamanho; aos 50 anos, esse número pula para 50%; após os 80 anos, mais de 80% da população masculina apresenta hiperplasia prostática benigna. A HPB é responsável por causar sintomas do trato urinário inferior na maioria dos pacientes masculinos acima dos 40 anos. O diagnóstico é eminentemente clínico e o escore de sintomas pode medir a intensidade do problema. O tratamento não cirúrgico da HPB evoluiu muito nos últimos anos e, atualmente, muitas cirurgias prostáticas são evitadas. Os pacientes podem ser classificados de acordo com a intensidade dos sintomas e do grau de obstrução infravesical; a qualidade de vida também é uma informação importante para o tratamento destes pacientes. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo analisar a produção científica relacionada as medidas preventivas para a hiperplasia prostática benigna no período de 2008 a 2013. **METODOLOGIA:** O estudo trata-se de uma revisão de literatura realizados em bases de dados (SciELO, BDNF, LILASCS, BVS, BIREME) utilizando os seguintes descritores: prevenção, cuidados, hiperplasia



prostática. Foram encontrados 17 trabalhos relacionados ao tema da pesquisa entre o período 2008 a 2013 que versavam sobre o objetivo do estudo, onde destes apenas 11 foram utilizados no estudo. Para a seleção dos artigos foram adotados os seguintes critérios: possuírem ou ter pertinência quanto objetivo do estudo, ter sido publicados entre os anos de 2008 e 2013 está indexados nas bases de dados SciELO, BDNF, LILASCS, BVSe BIREME. **RESULTADOS:** O enfermeiro ele vai juntamente trabalhar com a equipe multidisciplinar, onde poderá planejar sua atuação nos diferentes níveis de atenção a prevenção nas Unidades Básicas de Saúde, na Estratégia Saúde da Família e, também em clínicas, hospitais e outras instituições, pode-se trabalhar principalmente com os níveis de atenção primária e secundária. Primário, que visa à promoção da saúde, resultando no aumento do bem-estar global e na proteção específica direcionada a prevenção. **CONCLUSÃO:** Com base nos resultados obtidos com a revisão de literatura foi observado que a falta de conhecimento os meios preventivos impede uma maior adesão dos homens na realização da prevenção da hiperplasia próstata benigna. Em relação à própria saúde, o homem não se cuida o suficiente como deveria. Em geral, procura por atendimento apenas quando considera esta realmente doente ou impossibilitado de realizar suas atividades. Dificilmente o homem tem um comportamento de preocupação em realizar a prevenção das doenças.

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem, homens, HPB.



CONACIS

I CONGRESSO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
AVANÇOS, INTERFACES E PRÁTICAS INTEGRATIVAS
26 A 28 DE MARÇO DE 2014 | CAJAZEIRAS - PB

www.conacis.com.br