



O PARELELISMO DO CÂNCER DO COLO DO UTERO COM O VÍRUS HPV: REVISÃO INTEGRATIVA

1. Jéssica Layra Santana Callou. Faculdade Santa Maria/FSM. E-mail: jessicafsm2012@gmail.com.
2. Kariny da Silva Arrais. Faculdade Unifor/CE E-mail: kar_arrais@hotmail.com@hotmail.com.
3. Ocilma Barros de Quental. Faculdade Santa Maria/FSM. Email: ocilmaquental2011@hotmail.com
5. Débora Aparecida Beneval Bento. Faculdade Santa Maria/FSM. E-mail: deborahaparecida@hotmail.com
4. Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa. Faculdade Santa Maria/FSM. Email: ankilmar@hotmail.com.

Introdução: a neoplasia do colo uterino ainda é um sério problema de saúde pública em nosso país. A associação existente entre o papilomavirus humano (HPV) e o carcinoma escamoso cervical está sendo investigado há muitos anos. Hoje se sabe do papel central deste vírus na carcinogênese cervical e a afirmação de que não existe câncer do colo sem que o HPV se faça presente. Mulheres jovens após a iniciação sexual apresentam um maior risco de se contaminar com o papilomavirus, o que está, sobretudo, relacionado ao número de parceiros sexuais, sendo este o principal motivo da maior prevalência (número de ocorrência de casos) em meninas ao se comparado a mulheres acima de 30 anos de idade. **Objetivo:** avaliar a relação do câncer do colo do útero com o Papilomavirus Humano (HPV). **Método:** revisão na integra, descritiva-qualitativa, em buscas no banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. Utilizados os descritores controlados em Ciências da Saúde: Papillomavirus Humano; Câncer do colo uterino; HPV, definidos como critérios de busca aqueles publicados 2002-2010. **Resultados:** a análise dos devidos artigos possibilitou investigar a relação do câncer do colo do útero com o vírus



HPV, os resultados mostram que todas as mulheres acometidas pelo mesmo são mais susceptíveis a desencadear o câncer do colo do útero, e é de grande importância informar as mulheres sobre os meios preventivos e da necessidade de diagnóstico precoce, pois, ajuda a verificar o nível da lesão e o tratamento adequado. **Conclusão:** considerado como um problema de saúde pública o câncer do colo do útero e sendo o câncer mais comum entre as mulheres e o HPV é citado como o grande causador de lesões na mucosa e principalmente no epitélio genital. Este estudo permitiu a oportunidade de analisar a correlação do câncer do colo do útero com o HPV, e com base nessa análise, vimos da necessidade de existir programas voltados para mulheres acometidas pelo HPV, para que as mesmas compreenda a infecção, sabendo riscos, complicações e do nexos do câncer do colo de útero.

Palavras-chave: Papillomavirus; Câncer do colo do utero; HPV.